




florastart

Уникален листен тор за насърчаване на производството на цветен прашец, плодовитостта на цветовете и завързване на плодове



ОПИСАНИЕ

Флорастарт е биостимулант и тор с уникална формула, специално създаден за подобряване на етапа на цъфтеж, насърчаване на производството на цветен прашец и плодовитостта, както и подобряване на завързването на плодовете. Тези ефекти се получават благодарение на формулата, богата на Фосфор (P) и Калий (K), която осигурява на растението преди цъфтежа енергията и фотосинтетичната активност, необходими за тази ключова фаза от цикъла на развитие.

Ролята на Бора (B) върху жизнеността и плодовитостта на прашеца и върху оплождането е добре известна. Молибдена (Mo) позволява бърз метаболизъм на азота, който когато е в излишък може да стимулира вегетативното развитие в ущърб на опрашването и завързване на плодове.

Подхранващото действие на **Флорастарт** е подсилено от наличието на три свободни аминокиселини: глицин, глутаминова киселина и аспарагинова киселина. Глицинът стимулира устойчивостта към осмотичен стрес, дължащ се на температурни промени по време на цъфтежа и завързването на плодове, и стимулира растежа на цветните пъпки. Глутаминовата киселина е стимулатор за синтеза на други аминокиселини, необходими за протеиновия синтез. Аспарагиновата киселина участва в транспорта на азот.

СЪСТАВ

- Фосфор (P₂O₅), водоразтворим: 9,5%
 - Калий (K₂O), водоразтворим: 12,6%
 - Молибден (Mo), водоразтворим: 10,0%
 - Бор (B), водоразтворим: 8,0%
- Допълнителна информация:
- L - α свободни аминокиселини 5,0%

- Форма: микрогранула (WG)
- Цвет: Бял
- Разтворимост: 80г/л
- pH (1% разтвор): 7,7

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ягоди и ягодоплодни	0,02 - 0,03 kg/gka	Най-ниската доза във фаза пред-цъфреж, повторете според нуждите на културата
Бобови култури	0,02 - 0,03 kg/gka	Третирайте преди цъфтежа
Соя	0,05 kg/gka	В комбинация с хербициди и преди цъфтежа
Овощки и лозя	0,03 - 0,08 kg/gka	Третира се преди цъфтежа, след окапване на цветовете и завръзване на плодовете
Зеленчукови култури	0,025 - 0,05 kg/gka	Третирайте преди цъфтеж. Повтаряйте според нуждите на културата
Цвета	0,02 - 0,03kg/gka	От ранните фази на развитие

ДОЗИ И
НАЧИН НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пръскайте върху сухи листа с минимум 15-20 л/га, за да се осигури оптимална покривност. Преминете 3-4ч. без валежи за оптимална ефективност.

ФЕРТИГАЦИЯ

Овощки	0,20 - 0,30 kg/gka	2 - 3 третираня от пред-цъфтежа до залагане на плодовете, през 12 - 15 дни
Градински култури, ягодоплодни и цвета	150 - 200 г/1000 м ²	Прилага се от пред-цъфтежа до залагане на плодовете. Повтаряйте според нуждите на културата